



Dow AgroSciences

TreflanTM E.C. Herbicide

GROUPE	3	HERBICIDE
--------	---	-----------

Herbicide liquide sélectif incorporé au sol en présemis pour la suppression des mauvaises herbes dans bon nombre de grandes cultures, de légumes et de plantes ornementales.

AGRICOLE

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : trifluraline 480 g/L
Concentré émulsifiable

N° D'HOMOLOGATION 23933 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**NOCIF SI AVALÉ OU ABSORBÉ PAR LA PEAU
SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL**

**ATTENTION : L'INOBSERVATION DES DIRECTIVES APPARAISSANT SUR L'ÉTIQUETTE PEUT
ENTRAÎNER UNE SUPPRESSION IRRÉGULIÈRE DES MAUVAISES HERBES OU CAUSER DES
DÉGÂTS AUX CULTURES. LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT LA
PULVÉRISATION.**

CONTENU NET : 9,45 L, 115 L, 700 L

Dow AgroSciences Canada Inc.

Suite 2100, 450 - 1 Street S.W.

Calgary, Alberta

T2P 5H1

1-800-667-3852

®TM Marque de The Dow Chemical Company ("Dow") ou d'une société affiliée

TABLE DES MATIÈRES	PAGE
Précautions	
Premiers soins	
Renseignements toxicologiques	
Produit chimique agricole	
Risques pour l'environnement	
Entreposage	
Élimination	
Instructions	
Mises en garde	
Application	
Année de culture	
Culture en rotation	
Résistance des mauvaises herbes	
Mode d'emploi	
Préparation du sol	
Application	
Incorporation	
L'HERBICIDE TREFLAN E.C. UTILISÉ DANS LES PROVINCES DES PRAIRIES (INCLUS DE PAGE * À PAGE * INCLUSIVEMENT)	
Renseignements généraux sur les oléagineux et les cultures spéciales - provinces des prairies	
Cultures homologuées	
Mauvaises herbes supprimées	
Application au printemps	
Application à l'été	
Application à l'automne	
Travail du sol au printemps pour la préparation du lit de semence	
Instructions spéciales pour le lin et les lentilles	
Utilisation de l'herbicide Treflan E.C. pour les oléagineux et les cultures spéciales	
Application de l'herbicide Treflan E.C. avec des engrais liquides	
L'Herbicide Treflan E.C. mélangé par imprégnation ou enrobage à un engrais granulaire	
Utilisation de l'herbicide Treflan E.C. pour le soya	
L'herbicide Treflan E.C. additionné de l'herbicide Sencor (mélange en réservoir) : présemis incorporé	
Mauvaises herbes supprimées avec l'herbicide Treflan E.C. additionné de l'herbicide Sencor	
Application	
Étapes du mélange	
Pulvérisation	
Nettoyage du pulvérisateur	
Incorporation	
Travail du sol au printemps pour la préparation du lit de semence	
Application au printemps	
Application à l'automne	
Utilisation de l'herbicide Treflan E.C. sur le blé et l'orge : incorporation en postsemis (au moyen d'une herse)	
Cultures homologuées	
Mauvaises herbes supprimées	
Mode d'action	
Préparation du sol	
Application et incorporation	

L'herbicide Treflan E.C. additionné de l'herbicide Avadex BW (mélange en réservoir) : postsemis incorporé (au moyen d'une herse)	
Cultures homologuées.....	
Mauvaises herbes supprimées.....	
Préparation du sol.....	
Application et incorporation	
Utilisation de l'herbicide Treflan E.C. pour les fraisiers, les amélanchiers alnifoliés et les asperges établies	
Fraisiers	
Amélanchiers alnifoliés	
Asperges (établies depuis trois ans)	
Utilisation de l'herbicide Treflan E.C. pour les brise-vent	
Usages limités pour utilisation de l'herbicide Treflan E.C. additionné de l'herbicide Sencor 75 DF (mélange en réservoir) pour les brise-vent	
Utilisation de l'herbicide Treflan E.C. pour les légumes	
Utilisation de l'herbicide Treflan E.C. pour les cultures de légumes (application au printemps seulement) ..	
Utilisation de l'herbicide Treflan E.C. pour les cultures de légumineuses en culture fourragère (production de semences/fourrage)	
L'HERBICIDE TREFLAN E.C. UTILISÉ DANS L'EST DU CANADA ET EN COLOMBIE-BRITANNIQUE (DE PAGE * À PAGE * INCLUSIVEMENT)	
Renseignements généraux	
Cultures homologuées.....	
Mauvaises herbes supprimées.....	
Doses recommandées de l'herbicide Treflan E.C. par hectare - Est du Canada et Colombie-Britannique.....	
Application de l'herbicide Treflan E.C. avec des engrais liquides	
Essai de compatibilité	
L'herbicide Treflan E.C. mélangé par imprégnation ou enrobage à un engrais granulaire	
L'herbicide Treflan E.C. pour le soya	
L'herbicide Treflan E.C. additionné de l'herbicide Sencor ou de l'herbicide Lexone (mélange en réservoir) ..	
L'herbicide Treflan E.C., suivi de l'herbicide Lorox L ou de l'herbicide Afolan F (application alternée)	
L'herbicide Treflan E.C., suivi de l'herbicide Basagran avec l'herbicide Assist (application alternée)	
L'herbicide Treflan E.C. pour les haricots communs secs (blancs ou rouges)	
L'herbicide Treflan E.C. additionné de l'herbicide Eptam (mélange en réservoir).....	
L'herbicide Treflan E.C. additionné de l'herbicide Patoran FL (application alternée).....	
L'herbicide Treflan E.C., suivi de l'herbicide Basagran avec l'herbicide Assist.....	
Usages limités pour utilisation de l'herbicide Treflan E.C. et l'herbicide Pursuit (mélange en réservoir) :	
pour les haricots blancs	
L'herbicide Treflan E.C. pour le colza canola de printemps ordinaire et le colza canola résistant aux triazines	
Colza canola ordinaire.....	
Colza canola résistant aux triazines	
L'herbicide Treflan E.C. additionné d'un herbicide de postlevée de la famille des triazines homologué pour le colza canola résistant aux triazines	
L'herbicide Treflan E.C. pour les tomates	
L'herbicide Treflan E.C. additionné de l'herbicide Sencor dans les tomates transplantées (cultivées seulement pour la transformation)	
Utilisation de l'herbicide Treflan E.C. sur des asperges établies depuis trois ans	
L'herbicide Treflan E.C. utilisé sur les céréales d'automne cultivées en rotation avant le tabac jaune, pour supprimer l'agrostide jouet-du-vent	
Incorporé en postsemis (au moyen d'une herse)	
Cultures homologuées	
Application et incorporation	

L'herbicide Treflan E.C. utilisé avec sur des pommiers, abricotiers, cerisiers, pêchers, pruniers et poiriers de première année	
Usages limités pour utilisation de l'herbicide Treflan E.C. additionné de l'herbicide Dual Magnum ou l'herbicide Dual II Magnum et de l'herbicide Sencor (mélange en réservoir) présemis incorporé pour les tomates transplantées.....	
Zones tampons servant à protéger les habitats sensibles.....	
Recommandations sur la Gestion de la Résistance	
Avis à l'utilisateur	

PRÉCAUTIONS

NOCIF SI AVALÉ OU ABSORBÉ PAR LA PEAU

SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas entreposer près d'une source de chaleur ou d'une flamme. Éviter de contaminer les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les étangs à poissons.

Quiconque manipule le produit doit porter un vêtement à manches longues et un pantalon long. En outre, il faut porter des gants résistant aux produits chimiques pendant le mélange et le chargement ainsi que lors des activités de nettoyage et de réparation.

NE PAS entrer ni permettre l'entrée de travailleurs dans les sites traités durant le délai de sécurité de 12 heures.

Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis, et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada à www.croplife.ca.

PREMIERS SOINS

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

La décision de faire vomir ou non revient au médecin. Si l'on opte pour un lavage d'estomac, suggérer un examen œsophagien ou endotrachéal ou les deux. Le danger consécutif à l'aspiration du produit par les poumons doit être pesé en fonction de sa toxicité lorsqu'on envisage un lavage d'estomac. Pas d'antidote. Soins de soutien. Traitement fondé sur le jugement du médecin et les réactions du malade.

PRODUIT CHIMIQUE AGRICOLE

Ne pas expédier ni entreposer avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des médicaments ou des vêtements.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT

La contamination directe des étendues d'eau avec ce produit peut tuer les poissons qui s'y trouvent. Ne pas contaminer l'eau en y appliquant le produit directement, ni en y déversant l'eau de nettoyage de l'équipement ou les eaux usées. Ce produit contient un distillat de pétrole qui est de toxique à très toxique pour les organismes aquatiques. Éviter de contaminer les milieux aquatiques durant l'application. Ne pas contaminer ces milieux en y appliquant le produit directement, en éliminant les déchets ou en lavant l'équipement.

Ce produit est TOXIQUE pour les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés. Respecter les zones tampons prescrites sous la rubrique MODE D'EMPLOI. Afin de réduire le ruissellement à partir des sites traités vers les habitats aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compact ou sur de l'argile. Éviter d'appliquer ce produit lorsque des fortes pluies sont prévues. La contamination des secteurs aquatiques par le ruissellement peut être réduite par l'aménagement d'une bande de végétation entre le site traité et la lisière du plan d'eau.

ENTREPOSAGE

CRAINT LE GEL. Entreposer l'herbicide Treflan E.C. dans un endroit chauffé. La matière active pourrait se cristalliser à des températures inférieures à 5°C. Si l'on entrepose le produit à une température inférieure à 5°C, s'assurer, dans le fond de chaque contenant, qu'il n'y a pas de cristaux. S'il y en a, mettre le contenant dans un endroit chaud (au moins 15°C) pendant plusieurs heures. Dans le cas de petits contenants, agiter le contenu en inversant et en ramenant le contenant droit. Dans le cas de grands contenants, faire circuler le contenu. Après quelques heures, s'il reste encore des cristaux, agiter ou faire circuler le contenu de nouveau.

S'assurer que tous les cristaux sont dissouts avant d'introduire le produit dans la cuve du pulvérisateur.

ÉLIMINATION

Contenants recyclables :

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant vide trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Contenants retournables :

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Ce contenant vide peut être retourné au lieu de vente (distributeur/marchand) pour élimination.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

INSTRUCTIONS

L'INOBSERVATION DES DIRECTIVES APPARAISSANT SUR L'ÉTIQUETTE PEUT ENTRAÎNER UNE SUPPRESSION IRRÉGULIÈRE DES MAUVAISES HERBES OU CAUSER DES DOMMAGES AUX CULTURES. LES PRATIQUES DE SEMIS HABITUELLES OU STANDARDS POURRAIENT SE RÉVÉLER INSUFFISANTES. LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT LA PULVÉRISATION.

MISES EN GARDE

Application

- Ne pas appliquer l'herbicide Treflan E.C. sur des sols de tourbe ou sur des terreaux, ni sur des sols contenant plus de 15 % de matière organique.
- Ne pas l'appliquer dans des champs où l'on a épandu du fumier au cours des 12 derniers mois. Après cette période, s'assurer que le fumier s'est complètement désintégré et mélangé au sol jusqu'à une profondeur de 10 à 15 cm.

- Si l'andain étalé ou le chaume est brûlé, il faut, avant d'appliquer l'herbicide Treflan, travailler le sol une fois pour enlever de sa surface la couche de cendres.
- L'application sur des sols sujets à des périodes prolongées d'inondation risque d'accélérer la décomposition de l'herbicide. En outre, l'utilisation de ce produit sur des sols humides ou ayant subi un mauvais travail du sol pourrait en réduire l'action herbicide. Pour connaître les autres précautions à prendre, voir la section «Préparation du sol» dans la présente étiquette.
- Ne pas appliquer sur des sols contenant moins de 2 % de matière organique. Par ailleurs, l'application sur des tertres érodés ou sur des sols gris forestiers risque de réduire le peuplement des cultures, de retarder le développement des plantes ou de diminuer les rendements, qu'il s'agisse d'une culture traitée ou en rotation.
- Appliquer uniformément aux doses recommandées. Une application excessive, causée par le chevauchement, un mauvais calibrage ou une application inégale, risque de réduire le peuplement, qu'il s'agisse d'une culture traitée ou en rotation.
- NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.
- Pour éviter d'endommager les cultures futures de blé en rotation, les producteurs devraient, pour deux années consécutives, éviter de pulvériser de la trifluraline ou de l'éthalfuraline ou les deux sur le même sol aux doses utilisées pour les oléagineux, les cultures spéciales et l'orge.

Année de culture

- Appliqué et incorporé selon les directives, l'herbicide Treflan E.C. n'endommagera pas la culture, traitée ou en rotation. Cependant, les maladies des semis, un semis trop profond, une humidité excessive, une forte concentration de sel, le tassement du sol ou la sécheresse peuvent affaiblir les plants cultivés et accroître le risque de dommages, ce qui pourrait retarder le développement ou réduire le rendement de la culture.
- Pour réduire le risque de dommages à la culture traitée, utiliser une semence certifiée de bonne qualité. Semer à faible profondeur dans un lit de semence chaud et humide, en recourant à des pratiques agronomiques recommandées qui favoriseront une germination et une levée rapides et uniformes.
- À chaque culture correspond une profondeur de semis spécifique; si l'on sème à une plus grande profondeur que celle qui est recommandée, on risque d'endommager les jeunes plants. Consulter à ce sujet les documents publiés par l'industrie ou les organismes gouvernementaux.
- **ATTENTION** : Les cultures traitées ne doivent pas être broutées ni mises en fourrage, car on ne dispose pas de données suffisantes à ce sujet.

Culture en rotation

- Appliqué et incorporé selon les directives de l'étiquette, l'herbicide Treflan E.C. n'endommagera pas les cultures en rotation. Cependant, les maladies des semis, le froid, un semis profond, une humidité excessive, de fortes concentrations de sel, le tassement de sol ou la sécheresse peuvent affaiblir les plants cultivés et accroître le risque de dommages, ce qui pourrait retarder le développement ou réduire le rendement de la culture.
- Par mesure de précaution, après la récolte d'une culture traitée avec l'herbicide Treflan E.C., ne pas cultiver en rotation l'avoine, la betterave à sucre et des petites herbes comme la fléole des prés, l'alpiste des Canaries et la fétuque rouge traçante.
- La persistance de l'herbicide Treflan E.C. dépend de l'humidité du sol; la plus grande partie de la décomposition se produit pendant la période de végétation. S'il y a eu une longue sécheresse au cours de l'année de l'application, il se peut que des niveaux élevés de l'herbicide Treflan E.C. soient présents dans le sol. Pour réduire le risque de dommages aux cultures en rotation, semer à faible profondeur
- dans un lit de semence chaud et humide en recourant aux pratiques agronomiques et aux profondeurs de semis recommandées. Comme précaution additionnelle, augmenter légèrement (10 %) le taux de semis.

- **Dans l'Ouest du Canada seulement** - Ne pas semer du blé comme culture en rotation dans un sol où l'on a pulvérisé pendant deux années consécutives de la trifluraline ou de l'éthalfuraline ou les deux aux doses utilisées pour les oléagineux, les cultures spéciales et l'orge.
- **Dans l'Ouest du Canada seulement** - Ne pas semer directement (sans travail du sol) une culture en rotation dans la chaume sur pied lorsque la culture précédente a été traitée avec de la trifluraline ou de l'éthalfuraline. Il est fortement recommandé de travailler le sol avant de semer la culture en rotation, ce qui facilite l'aération du sol et sa mise en état comme couche de semis et, par conséquent, favorise la germination.
- Pour semer une culture en rotation, utiliser une semence certifiée de bonne qualité. Semer à faible profondeur dans un lit de semence chaud et humide en recourant à des pratiques agronomiques recommandées qui favoriseront une germination et une levée rapides et uniformes. **Éviter les semis profonds, les lits de semence meubles et les semis dans des sols froids.**
- À chaque culture correspond une profondeur de semis spécifique; si on sème à une plus grande profondeur que celle qui est recommandée, on risque d'endommager les jeunes plants. Consulter à ce sujet les documents publiés par l'industrie ou les organismes gouvernementaux.

Résistance des mauvaises herbes

Des populations de sétaire verte ont acquis une tolérance à la trifluraline dans un certain nombre de champs de l'Ouest canadien traités par de la trifluraline depuis longtemps et de façon répétée. Par conséquent, les produits contenant de la trifluraline ou de l'éthalfuraline (les herbicides Advance™ 10G, Treflan E.C., Heritage™, Triflurex¹, Rival², Fortress³ et Edge™) ne sont pas efficaces sur la sétaire verte résistante à la trifluraline. Pour retarder la sélection ou réduire la propagation de cette sétaire, éviter toute utilisation répétée des produits susmentionnés dans le même champ, ou utiliser un herbicide différent. Comme mesure préventive, Dow AgroSciences recommande d'utiliser en rotation des herbicides qui présentent différents modes d'action. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consulter le personnel des organismes provinciaux.

MODE D'EMPLOI

L'herbicide Treflan E.C. est un herbicide de prélevée que l'on incorpore au sol pour assurer une suppression durable d'un grand nombre de graminées annuelles et de mauvaises herbes à feuilles larges. L'herbicide Treflan E.C. supprime les mauvaises herbes vulnérables dès leur germination, mais il est sans effet sur les mauvaises herbes établies.

- NE PAS appliquer ce produit d'une manière qui le mettrait en contact avec des travailleurs ou d'autres personnes, soit directement, soit par dérive. Seuls des utilisateurs portant un équipement de protection individuelle sont autorisés à pénétrer dans le site de traitement pendant l'application.
- Jeter les vêtements et les autres matières absorbantes qui ont été fortement contaminés par le produit. NE PAS les réutiliser.
- Les utilisateurs doivent enlever leurs vêtements immédiatement si le pesticide s'est infiltré dessous. Ils doivent ensuite se laver soigneusement la peau et enfiler des vêtements propres.
- NE PAS appliquer ce produit directement dans les habitats d'eau douce (tels que lacs, rivières, brouillards, étangs, fondrières des Prairies, criques, marais, ruisseaux, réservoirs, fossés et milieux humides), les habitats estuariens ou les habitats marins.
- NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation ou d'eau potable ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.
- Pour réduire les rejets par volatilisation de trifluraline dans l'environnement, ce produit ne doit être appliqué que par temps frais, le matin ou le soir, lorsque la température de l'air est de 15°C ou moins. Pour réduire encore davantage la volatilisation dans l'atmosphère, il faut procéder à l'incorporation dans le sol tout de suite après le traitement.

Application à l'aide d'un pulvérisateur agricole

NE PAS appliquer durant les périodes de calme plat ni lorsque les vents soufflent en rafales. NE PAS pulvériser des gouttelettes de taille inférieure au calibre moyen de la classification de l'American Society of Agricultural Engineers (ASAE). La rampe de pulvérisation doit être fixée à 60 cm ou moins du sol ou du couvert végétal.

NE PAS pulvériser ce produit par voie aérienne

Préparation du sol

Avant d'appliquer l'herbicide Treflan E.C., travailler la terre pour détruire les mauvaises herbes existantes et défaire les grosses mottes de terre. Lors de l'application de l'herbicide Treflan E.C. sur un champ de chaume, couper les résidus de la récolte et bien les incorporer au sol jusqu'à une profondeur de 10 cm. Les instruments aratoires à disques produisent de meilleurs résultats. Répartir uniformément les andains avant de travailler la terre, afin d'éviter les bandes à recouvrement concentré de débris végétaux. L'herbicide Treflan E.C. ne devrait pas être pulvérisé sur un sol dont la surface est recouverte de plus de 25 % de débris. Afin d'éviter que la semence de folle avoine ne se concentre sous la couche de terre traitée, ne pas labourer (ou travailler à l'aide d'un versoir) le sol avant d'appliquer l'herbicide Treflan E.C. Si un andain a été brûlé, avant d'appliquer l'herbicide Treflan E.C., travailler le sol une fois pour enlever la couche de matières carbonisées.

Application

- Tout en remplissant le réservoir du pulvérisateur avec de l'eau propre, ajouter la quantité recommandée de l'herbicide Treflan E.C. et bien agiter. Appliquer l'herbicide dans au moins 100 L/ha d'eau (sur toute la surface) à l'aide d'un pulvérisateur basse pression correctement calibré pour bien répartir le mélange. Vérifier le pulvérisateur tous les jours pour s'assurer qu'il est bien calibré et permet une application uniforme sur l'ensemble du champ. Pulvériser l'herbicide Treflan E.C. à la surface du sol et, dans la mesure du possible, l'incorporer en une seule opération. Prendre soin de briser les grosses mottes.
- L'incorporation du produit doit se faire dans les 24 heures suivant son application. S'il est pulvérisé conformément aux directives, l'herbicide Treflan E.C. n'endommagera pas les cultures traitées ni les cultures en rotation subséquentes; toutefois, une application excessive causée par le chevauchement, le fonctionnement du pulvérisateur sans déplacement, un mauvais calibrage, une application inégale, etc. peut réduire le peuplement, qu'il s'agisse d'une culture traitée ou en rotation.

Incorporation

- Incorporer l'herbicide Treflan E.C. dans le sol dans deux directions. Utiliser un cultivateur à disques en tandem, un disque-semoir ou un cultivateur de champs (vibroculteur) pour la première incorporation, en le réglant pour une profondeur de 8 à 10 centimètres. Un cultivateur de champs (vibroculteur) se définit comme un instrument couvrant de 3 à 4 rangées de socs espacés de 20 cm ou moins et disposés en zigzag afin d'assurer que l'ensemble du sol est labouré. La deuxième incorporation (à l'aide d'un disque-semoir ou d'un cultivateur) devrait être effectuée perpendiculairement à la première, à la même profondeur, avant le semis.
- Faire avancer la charrue à disques à une vitesse de 7 à 10 km/h, et les cultivateurs à une vitesse de 10 à 13 km/h. Si l'on ne fait pas fonctionner les instruments aux vitesses recommandées, on pourrait observer une suppression irrégulière des mauvaises herbes en raison d'une distribution inappropriée de l'herbicide Treflan E.C. dans le sol. **(Il n'est pas recommandé d'utiliser un cultivateur pour labour profond.)**
- Si le sol est recouvert d'une croûte, rempli de mottes ou trop mouillé pour permettre un bon mélange, ne pas incorporer l'herbicide Treflan E.C. avec un cultivateur de champs.
- Il est préférable d'utiliser un cultivateur à disques sur le chaume pour assurer une profondeur de travail de 10 cm.
- L'incorporation du produit au moyen d'instruments qui travaillent la terre à moins de 8 cm de profondeur ou à plus de 10 cm peut entraîner une suppression irrégulière des mauvaises herbes ou causer des dommages aux cultures traitées ou en rotation.

- Les sarcleuses à barres, les herse, les cultivateurs pour labour profond, les cultivateurs sous-soleurs ou les rigoleuses ne conviennent pas.

HERBICIDE TREFLAN E.C. UTILISÉ DANS LES PROVINCES DES PRAIRIES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LES OLÉAGINEUX ET LES CULTURES SPÉCIALES - PROVINCES DES PRAIRIES

Cultures homologuées

colza canola	crambe
canola résistant aux triazines	sainfoin
moutarde	mélilot (printemps seulement)
lin (application à l'été et à l'automne seulement)	légumes (voir instructions spéciales)
haricots communs secs (blancs ou rouges)	fraises (application au printemps seulement)
fève noire	asperges établies depuis trois ans
soya	brise-vent transplantés
féverole (faba ou fève à cheval)	amélanchier alnifolié
pois (de grande culture ou de transformation)	légumineuses en culture fourragère
lentilles (automne seulement)	•plants de trèfle hybride
tournesol	•trèfle rouge
carthame	•astragale pois chiche
luzerne (cultures de couverture de lin et de colza)	•lotier corniculé
canola seulement)	

Mauvaises herbes supprimées

Graminées annuelles

sétaire (verte ou glauque)
 pied-de-coq
 digitale pourpre
 brome des toits
 brome des seigles
 éragrostide fétide
 éleusine de l'Inde
 pâturin annuel
 ivraie de Perse

Espèces annuelles à feuilles larges

renouée liseron
 saponaire des vaches
 amarante
 chénopode blanc
 stellaire
 pourpier potager
 renouée des oiseaux
 mollugine verticillée

L'herbicide Treflan E.C. ne permet pas de supprimer la sétaire verte résistant à la trifluraline. Se référer aux recommandations spécifiques dans le chapitre **MISES EN GARDE** et à la section **Résistance des mauvaises herbes** de la présente étiquette.

Mauvaises herbes réprimées

Folle avoine

NOTE : Employé selon les directives, l'herbicide Treflan E.C. permettra, sur le plan commercial, une suppression acceptable des mauvaises herbes susmentionnées. Certaines renouées liserons pourraient échapper à l'action herbicide de l'herbicide Treflan E.C., mais elles subiront un retard de croissance ou demeureront dans un état peu compétitif.

Application au printemps

À la suite d'une application de l'herbicide Treflan E.C., on peut soit attendre jusqu'à trois semaines avant de planter, soit planter immédiatement.

Application à l'été

On peut appliquer l'herbicide Treflan E.C. sur des terres en jachère entre le 1^{er} juin et le 1^{er} septembre pour la suppression des mauvaises herbes dans les cultures de colza canola et de lin pour l'année suivante. Pulvériser la dose d'été et procéder à l'incorporation comme décrit précédemment. Non recommandé sur un sol sableux ou un loam sableux.

Incorporer l'herbicide Treflan E.C. dans le sol à deux reprises au moins, dans deux directions. L'incorporation initiale doit se faire dans les 24 heures suivant l'application. La deuxième incorporation (ainsi que les incorporations subséquentes) peuvent se faire tant qu'il sera nécessaire de détruire les mauvaises herbes résistantes, pendant le reste de la saison de jachère. Au printemps précédant la plantation, il est nécessaire de travailler le sol en surface (entre 5 et 8 cm). (Se référer à la section «Travail du sol au printemps pour la préparation du lit de semence».)

Application à l'automne

On peut appliquer l'herbicide Treflan E.C. à l'automne entre le 1^{er} septembre et le gel du sol pour la suppression des mauvaises herbes de l'année suivante. Pulvériser les doses d'automne et incorporer comme décrit précédemment. L'incorporation initiale doit se faire dans les 24 heures suivant l'application. Il est préférable de procéder aux deux incorporations à l'automne et de travailler le sol (de 5 à 8 cm) au printemps avant la plantation. Cependant, on pourrait faire une incorporation à l'automne et l'autre au printemps au moment de la préparation du lit de semence, à condition que l'on respecte les profondeurs recommandées. (Se référer à la section «Travail du sol au printemps pour la préparation du lit de semence».)

Travail du sol au printemps pour la préparation du lit de semence

Au printemps, le travail du sol qui suit une application d'été ou d'automne de l'herbicide Treflan E.C. doit se faire avant l'ensemencement, lorsque le sol est suffisamment chaud pour favoriser la germination. Utiliser un cultivateur à disques ou de champs (vibroculteur), en le réglant à une profondeur de 5 à 8 cm. Pour une suppression optimale des mauvaises herbes dans un sol qui présente un peuplement important de folle avoine, procéder à un travail préliminaire du sol en surface au début du printemps afin de favoriser la germination des semences de mauvaises herbes. Ensuite, travailler le sol à une profondeur de 5 à 8 cm avant d'ensemencer pour détruire les plantules de mauvaises herbes. Éviter de transplanter les jeunes plants de mauvaises herbes; ensemer dans un lit de semence exempt de mauvaises herbes en se conformant aux pratiques culturales acceptées. Éviter le tassement excessif de la couche de terre traitée avec l'herbicide Treflan E.C. Toute opération qui laisse la terre traitée moins profonde ou tassée peut entraîner l'émergence des mauvaises herbes. Ce tassement peut être attribuable aux roues d'un tracteur, d'un cultivateur, d'un semoir en ligne, ou à n'importe quelle opération au champ effectuée après l'incorporation. Les sols sont plus susceptibles au tassement lorsqu'ils sont humides.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE LIN ET LES LENTILLES

1. Les deux incorporations de l'herbicide Treflan E.C. doivent se faire dans la saison d'application précédant l'ensemencement du lin au printemps.
2. Au printemps, on doit travailler le lit de semence en surface (de 5 à 8 cm) et le tasser immédiatement avant l'ensemencement afin d'assurer la fermeté du lit de semence et l'exactitude de la profondeur de plantation.
3. L'ensemencement doit se faire à l'aide d'un semoir en ligne ou d'une rigoleuse. Ensemencer dans un lit de semence de 4 cm de profondeur au maximum.
4. Ne pas ensemer le lin au début de mai quand le sol est encore froid. On ne devrait pas ensemer avant le 15 mai.
5. Se référer à la section «Mises en garde» au sujet des stress qui peuvent endommager les cultures ou en réduire le rendement.

UTILISATION DE L'HERBICIDE TREFLAN E.C. POUR LES OLÉAGINEUX ET LES CULTURES SPÉCIALES

Doses recommandées de l'herbicide Treflan E.C.

Culture	Zone de sols et matière organique	Textures du sol	
		Légère	Moyenne ou lourde
		Sable loam sableux	loam, loam limono-argileux loam limoneux, loam argileux, limon, argile limoneuse, loam sablo-argileux, argile
Printemps colza canola, colza canola résistant aux triazines, moutarde, haricots communs secs (blancs ou rouges), soya, féveroles (faba), fèves noires, pois, tournesol, carthame, crambe, luzerne, sainfoin, mélilot	brun, brun foncé ou noir de 2 à 6 % de matière organique	1,7 L/ha	2,3 L/ha
	noir ou noir foncé de 6 à 15 % de matière organique	2,3 L/ha	de 2,3 à 3,0 L/ha (utiliser une dose de 3,0 L/ha en cas d'infestation importante de folle avoine)
Été colza canola, colza canola résistant aux triazines, lin, carthame	brun, brun foncé, noir ou noir foncé	non recommandé	3,4 L/ha
Automne colza canola, colza canola résistant aux triazines, moutarde, haricots communs secs (blancs ou rouges), lin, soya, féveroles (faba), fèves noires, pois, lentilles, tournesol, carthame, luzerne	brun, brun foncé ou noir de 2 à 6 % de matière organique	2,3 L/ha	3,0 L/ha
	noir ou noir foncé de 6 à 15 % de matière organique	3,0 L/ha	3,0 à 3,4 L/ha (utiliser une dose de 3,4 L/ha en cas d'infestation importante de folle avoine)

Note : La première incorporation du produit doit se faire dans les 24 heures suivant son application.

APPLICATION DE HERBICIDE TREFLAN E.C. AVEC DES ENGRAIS LIQUIDES

On peut mélanger l'herbicide Treflan E.C. à un engrais azoté liquide (comme le 28-0-0) pour une application en présemis ou postsemis incorporée. On peut également le mélanger à l'herbicide Avadex BW⁴ et à un engrais liquide pour une application de postsemis incorporée dans le blé et l'orge. On doit cependant se conformer à toutes les indications données sur l'étiquette de l'herbicide Treflan E.C. : doses par hectare, cultures homologuées, incorporation, instructions spéciales, mises en garde et précautions particulières.

Verser l'herbicide Treflan E.C. directement dans l'engrais liquide, mélanger à fond et appliquer aussitôt que possible. Agiter sans arrêt jusqu'à la fin de l'application. Pulvériser la bouillie ainsi obtenue à l'aide d'un appareil bien calibré, approprié pour la pulvérisation d'engrais liquide. S'assurer que le produit est appliqué uniformément à la surface du sol. Pour l'incorporation, procéder de la façon normale.

Avant de mélanger l'engrais liquide et l'herbicide dans le réservoir, mélanger de petites quantités des deux pour voir s'ils sont compatibles. Procéder de la façon suivante :

1. Verser 500 mL d'engrais liquide dans un récipient de 1 litre.
2. Ajouter 10 mL de l'herbicide Treflan E.C.
3. Fermer le récipient et bien agiter.
4. L'herbicide et l'engrais sont compatibles si le premier reste en suspension après cinq minutes. Si l'herbicide se dépose rapidement, mais se remet en suspension facilement après agitation, on peut utiliser le mélange à condition de l'agiter constamment.
5. Un essai de compatibilité devrait être effectué aussi chaque fois que l'on change d'engrais ou de composition d'engrais, ou que les températures varient.

HERBICIDE TREFLAN E.C. MÉLANGÉ PAR IMPRÉGNATION OU ENROBAGE À UN ENGRAIS GRANULAIRE

Un engrais granulaire en vrac peut être imprégné ou enrobé de l'herbicide Treflan E.C. L'application devrait être effectuée le plus tôt possible après le mélange. Il faut se conformer à toutes les recommandations, précautions, mises en garde et directives spéciales qui apparaissent sur l'étiquette de l'herbicide Treflan E.C. concernant entre autres les doses par hectare, les cultures homologuées et l'incorporation.

Pour une suppression acceptable des mauvaises herbes sur le plan commercial au moyen de l'herbicide Treflan E.C. mélangé par imprégnation à un engrais, on doit appliquer les doses minimales d'engrais suivantes :

Application au printemps - 330 kg/ha

Application à l'automne - 250 kg/ha

Mélanger l'engrais granulaire et l'herbicide Treflan E.C. dans un mélangeur d'engrais ordinaire, de façon à obtenir une couverture uniforme. Mélanger suffisamment longtemps pour obtenir un bon enrobage ou une bonne imprégnation avec l'herbicide Treflan E.C.

Épandre le mélange d'engrais et d'herbicide Treflan E.C. uniformément sur la surface du sol, avec un applicateur d'engrais granulaire correctement calibré. La première incorporation doit se faire le plus tôt possible (dans les 24 heures) après l'application. Pour une dispersion maximale de l'herbicide Treflan dans le sol, on recommande **d'attendre au moins six jours avant de procéder à la seconde incorporation.**

ATTENTION : On peut utiliser n'importe quel engrais granulaire pour l'imprégnation de l'herbicide Treflan E.C., **à l'exception** du nitrate d'ammonium. L'utilisation du nitrate d'ammonium en combinaison avec l'herbicide Treflan E.C. peut provoquer une explosion et un incendie.

NOTE : Il incombe à la personne ou à la compagnie qui vend le mélange d'engrais et de l'herbicide Treflan E.C. de se conformer à la Loi sur les engrais (Agriculture et Agro-alimentaire Canada) et aux règlements s'y rapportant.

UTILISATION DE L'HERBICIDE TREFLAN E.C. POUR LE SOYA

Pour l'utilisation de l'herbicide Treflan E.C. sur le soya, se référer à la section «Utilisation de l'herbicide Treflan E.C. pour les oléagineux et les cultures spéciales». La suppression des mauvaises herbes dans le soya peut se faire à l'aide d'un mélange en réservoir de l'herbicide Treflan E.C. et de l'herbicide Sencor⁶.

NOTE : Dans les champs traités à l'herbicide Sencor, ne pas semer les variétés de soya suivantes : Ace, Apache, Baron, DAC Eramosa, Maple Amber, Maple Ridge, Nottawa, OAC Eramosa ou Portage. Autrement, la culture pourrait subir des dommages inacceptables.

HERBICIDE TREFLAN E.C. ADDITIONNÉ DE L'HERBICIDE SENCOR (MÉLANGE EN RÉSERVOIR) : PRÉSEMI INCORPORÉ

Le mélange en réservoir de l'herbicide Treflan et de l'herbicide Sencor peut être appliqué comme traitement généralisé en présems incorporé sur le soya canola pour la suppression des graminées annuelles et des mauvaises herbes à feuilles larges.

Mauvaises herbes supprimées avec l'herbicide Treflan E.C. additionné de l'herbicide Sencor

En plus des espèces que l'herbicide Treflan E.C. seul permet de supprimer, l'herbicide Treflan E.C. additionné de l'herbicide Sencor mélangé en réservoir supprimera les espèces suivantes :

moutarde des champs	bourse à pasteur
tabouret des champs	ortie royale
renouée scabre	renouée persicaire
colza canola spontané (non résistant à la triazine)	

Application

Sélectionner les doses appropriées de l'herbicide Treflan E.C. et de l'herbicide Sencor 500 F/DF 75 % comme indiqué en fonction du type de sol et du pourcentage de matière organique. Suivre toutes les directives et précautions relativement à la préparation du sol, au mélange, à la pulvérisation et à l'incorporation, inscrites sur cette étiquette.

Étapes du mélange

Il est important de suivre un ordre exact pour mélanger dans le réservoir du pulvérisateur l'herbicide Treflan E.C. et l'herbicide Sencor.

Les étapes suivantes sont essentielles lorsqu'on combine l'herbicide Treflan E.C. et l'herbicide Sencor :

1. Remplir le réservoir avec de l'eau propre, au quart ou au tiers de sa capacité.
2. Durant le remplissage, et après avoir mis en marche le système d'agitation et de recirculation, verser lentement dans le réservoir toute la dose nécessaire de l'herbicide Sencor.
3. Remplir le réservoir d'eau propre jusqu'au niveau désiré, tout en continuant d'agiter le mélange.
4. Après avoir bien mélangé, ajouter la quantité mesurée de l'herbicide Treflan E.C. et agiter à fond.
5. Pour éviter des problèmes de compatibilité, appliquer immédiatement. Il faut agiter sans arrêt jusqu'à ce que le mélange soit pulvérisé; sinon, l'agent chimique se déposera au fond et il faudra le mélanger vigoureusement à l'aide d'une palette pour le redisperser dans le réservoir.

Se référer à la procédure de rinçage, d'évacuation et d'élimination afin d'assurer que les contenants sont vidés avant l'élimination.

Pulvérisation

Pulvériser le mélange en réservoir de l'herbicide Treflan E.C. et de l'herbicide Sencor à la surface du sol et l'incorporer au cours de la même opération, si possible. La première incorporation doit se faire dans les 24 heures suivant l'application. Appliquer le mélange en réservoir dans un minimum de 100 L/ha (traitement généralisé) au moyen d'un pulvérisateur à basse pression correctement calibré pour bien répartir le mélange. On peut utiliser un pulvérisateur commercial de grande culture tracté ou automoteur muni de l'équipement suivant :

1. des embouts pas plus petits que 6502, 8002 ou TK2, avec des tamis dont les mailles ne sont pas plus fines que 0,3 mm (50 mesh);
2. des filtres ou des tamis de conduite d'une grosseur de 0,3 mm ou plus;

- une pompe de capacité suffisante pour fournir un volume adéquat dans la conduite de dérivation ou le système d'agitation au jet afin d'assurer l'uniformité de pulvérisation de la bouillie quand les rampes sont en marche.

NOTE : Les filtres feutres, les petits embouts de buse ou les tamis à mailles plus petites vont s'obstruer.

Nettoyage du pulvérisateur

On doit nettoyer à fond l'équipement de pulvérisation afin d'éliminer toute trace d'herbicide susceptible de nuire aux autres cultures à traiter. Vider le reste de la bouillie de l'herbicide Sencor et de l'herbicide Treflan E.C. contenue dans le pulvérisateur et l'éliminer dans des zones non cultivées éloignées des sources d'eau. Rincer la cuve du pulvérisateur et la remplir d'eau; ajouter un détergent à usage industriel à raison de 250 mL par 100 L d'eau. Recycler ce mélange dans l'équipement pendant 5 minutes et l'expulser en pulvérisant. Répéter cette procédure à deux reprises. Remplir le réservoir du pulvérisateur d'eau propre, recycler pendant 5 minutes et l'expulser en pulvérisant. Bien nettoyer la pompe et les buses. Nettoyer toute bouillie qui pourrait se trouver sur la cuve du pulvérisateur, sur les buses ou sur l'équipement de pulvérisation.

Incorporation

Se référer à l'information générale sur les oléagineux et les cultures spéciales.

NOTE : On peut appliquer le mélange de l'herbicide Treflan E.C. et de l'herbicide Sencor à l'automne avant le gel du sol pour la suppression des mauvaises herbes de l'année suivante. Pulvériser les doses d'automne et incorporer comme décrit précédemment. L'incorporation initiale doit se faire dans les 24 heures suivant l'application. Il est préférable de procéder aux deux incorporations à l'automne, et de travailler le sol (de 5 à 8 cm) au printemps avant la plantation. Cependant, on pourrait faire une première incorporation à l'automne et l'autre au printemps au moment de la préparation du lit de semence, à condition que l'on respecte les profondeurs recommandées (se référer à la section «Travail du sol au printemps pour la préparation du lit de semence»).

Travail du sol au printemps pour la préparation du lit de semence

Au printemps, le travail du sol qui suit une application d'automne de l'herbicide Treflan E.C. et de l'herbicide Sencor doit se faire lorsque le sol est suffisamment chaud pour favoriser la germination. Utiliser un cultivateur à disques ou de champs (vibroculteur), en le réglant à une profondeur de 5 à 8 cm. Éviter de transplanter les jeunes plants de mauvaises herbes; ensemercer dans un lit de semence exempt de mauvaises herbes en se conformant aux pratiques culturales acceptées.

Application au printemps

Doses recommandées de produit par hectare

Herbicide Treflan E.C.	Texture du sol	
	Légère	Moyenne ou lourde
Zones de sol et matière organique	Sable loam sableux	loam, loam limono-argileux loam limoneux, loam argileux, limon, argile limoneuse, loam sablo-argileux, argile
2 à 6 % de matière organique	1,7 L/ha	2,3 L/ha
6 à 15 % de matière organique	2,3 L/ha	2,3 à 3,0 L/ha*
Herbicide Sencor		
Matière organique	DF 75	500F
2 à 3 %	275 g/ha	425 mL/ha
3 à 6 %	375 g/ha	500 mL/ha
6 à 10 %	375 à 550 g/ha	500 à 650 mL/ha
10 % et +	550 g/ha et plus	850 mL/ha et +

*Utiliser une dose de 3,0 L/ha de l'herbicide Treflan E.C. en cas d'une invasion importante de folle avoine.

Application à l'automne**Doses recommandées de produit par hectare**

Herbicide Treflan E.C.	Texture du sol	
	Légère	Moyenne ou lourde
Zones de sol et matière organique	Sable loam sableux	loam, loam limono-argileux loam limoneux, loam argileux, limon, argile limoneuse, loam sablo-argileux, argile
2 à 6 % de matière organique	2,3 L/ha	3,0 L/ha
6 à 15 % de matière organique	3,0 L/ha	3,0 à 3,4 L/ha [*]
Herbicide Sencor		
Matière organique	DF 75	500F
2 à 3 %	375 g/ha	550 mL/ha
3 à 6 %	475 g/ha	700 mL/ha
6 à 10 %	475 à 550 g/ha	700 à 850 mL/ha
10 % et +	550 g/ha et plus	850 mL/ha et +

^{*}Utiliser une dose de 3,4 L/ha de l'herbicide Treflan E.C. en cas d'une invasion importante de folle avoine.

NOTE :

1. Dans les sols variables comportant des zones sableuses légères, la culture pourrait y être endommagée si la dose utilisée est celle recommandée pour un sol lourd.
2. Ne pas utiliser sur des sols contenant moins de 2 % de matière organique.
3. Sur des sols qui comportent 10 % de matière organique et plus, la suppression des mauvaises herbes à feuilles larges pourrait se révéler inapproprié.
4. Ces mélanges en réservoir, appliqués de façon inégale ou mal incorporés, risquent d'entraîner une suppression irrégulière des mauvaises herbes ou de causer des dommages aux cultures, selon les doses utilisées.
5. Des conditions de stress comme les maladies des semis, le froid, un semis trop profond, une humidité excessive, une forte concentration de sel ou une sécheresse, peuvent affaiblir les jeunes plants de colza canola et accroître la possibilité de dommages causés par le mélange de l'herbicide Treflan E.C. et de l'herbicide Sencor. On observe parfois une décoloration temporaire des bords des cotylédons et un léger retard du développement de la culture. Ces phénomènes disparaissent rapidement et n'ont généralement aucun effet permanent.

IMPORTANT : Les cultures en rotation (p. ex. : oignons, céleris, poivrons, choux, laitues et épinards, betteraves à sucre, betteraves et navet, citrouille et courges, concombres et melons, tabac et espèces de colza canola non résistantes aux triazines) sont sensibles à l'herbicide Sencor et peuvent être endommagées si elles sont plantées dans des sols traités avec l'herbicide Sencor au cours de l'année de l'application et de l'année suivante. Après la récolte, utiliser des méthodes de labour qui permettent de bien mêler la terre, car cette pratique réduira les risques de dommages aux cultures ultérieures.

Comme précaution, l'avoine, la betterave à sucre et les petites graminées annuelles comme la fléole des prés, l'alpiste des Canaries et la fétuque rouge traçante, ne devraient pas être cultivées en rotation après une culture traitée avec l'herbicide Treflan E.C.

UTILISATION DE L'HERBICIDE TREFLAN E.C. SUR LE BLÉ ET L'ORGE : INCORPORATION EN POSTSEMI (AU MOYEN D'UNE HERSE)
Cultures homologuées

blé de force roux de printemps

blé dur

blé tendre blanc de printemps

orge

Mauvaises herbes supprimées

sétaire (verte* et glauque)

*L'herbicide Treflan E.C. ne permet pas la suppression de la sétaire verte résistant à la trifluraline. Se référer aux recommandations spécifiques dans le chapitre **MISES EN GARDE** et à la section **Résistance des mauvaises herbes** de cette étiquette.

Mode d'action

L'herbicide Treflan E.C. est appliqué et incorporé au sol au printemps, le plus tôt possible après le semis et avant la levée du blé et de l'orge, de façon à supprimer la sétaire (verte et glauque). Pour ce faire, on établit une couche traitée peu profonde (2 cm) de l'herbicide Treflan E.C. près de la surface du sol; l'herbicide Treflan E.C. supprime les mauvaises herbes en détruisant les semences à mesure qu'elles germent. En général, la majorité des semences de sétaire germent à cette profondeur. Cependant, il se pourrait que la sétaire germe à une plus grande profondeur certaines années, en raison des conditions climatiques. Par conséquent, il se peut que les semences de sétaire plus profondes qui germeraient sous la couche de l'herbicide Treflan E.C. ne soient pas supprimées. Ce traitement est sans danger pour la culture de blé et d'orge, puisque les semences de blé et d'orge se trouvent dans la partie non traitée du sol, sous la couche de l'herbicide Treflan E.C.

Préparation du sol

Semer le blé et l'orge normalement. Ces céréales doivent être ensemencées à une profondeur de 5 à 8 cm dans un lit de semence bien travaillé.

Application et incorporation

Herbicide Treflan E.C. (Au moyen d'une herse)

Dose par hectare

Herbicide Treflan E.C.	Texture du sol	
	Légère à moyenne	Lourde
	1,2 L/ha	1,7 L/ha

1. Dans la cuve du pulvérisateur, ajouter la quantité recommandée de l'herbicide Treflan E.C. dans de l'eau propre au cours de l'opération de remplissage et agiter à fond. Appliquer l'herbicide dans au moins 100 L/ha d'eau (traitement généralisé) au moyen d'un pulvérisateur à basse pression bien calibré. Vérifier le pulvérisateur tous les jours pour s'assurer qu'il est bien calibré et permet une application uniforme.
2. Appliquer l'herbicide Treflan E.C. le plus tôt possible après le semis et avant la levée de la culture.
3. L'application de l'herbicide Treflan E.C. doit se faire sur un sol sans débris ou en jachère l'année précédente. Ne pas pulvériser l'herbicide Treflan E.C. si le sol est recouvert d'une croûte, rempli de mottes ou trop mouillé pour permettre un bon mélange.
4. L'application et la première incorporation doivent être faites au cours de la même opération si possible. Incorporer à une faible profondeur avec une herse à griffes pointues ou en forme de losange, dans deux directions différentes, à une vitesse de 8 à 11 km/h. Les deux incorporations doivent avoir lieu dans les 24 heures suivant l'application. Si l'incorporation n'est pas uniforme, il se pourrait que la semence de sétaire ne soit pas atteinte dans le creux des sillons creusés par la dernière rangée de pointes, advenant le cas où la profondeur de la couche traitée à l'herbicide Treflan soit insuffisante pour prévenir l'émergence de la sétaire. Pour que la couche de sol soit traitée de façon uniforme, utiliser une herse à griffes pointues inclinées vers l'arrière à 45 degrés au moins, à une vitesse permettant de réduire au minimum le billonnage.

ATTENTION : Le semis de blé ou d'orge peut être endommagé s'il est ensemencé dans la couche traitée ou dans une couche profondément incorporée de l'herbicide Treflan E.C. Appliqué selon les directives et dans des conditions de croissance normale, l'herbicide Treflan E.C. n'endommagera pas les cultures de blé et d'orge. Cependant, les maladies des semis, le froid, une profondeur d'ensemencement inappropriée, une humidité excessive, de fortes concentrations de sel ou la sécheresse peuvent affaiblir les plants cultivés et accroître le risque de dommages causés par l'herbicide Treflan E.C. Dans de telles conditions, on pourrait observer un retard dans le développement ou une réduction du rendement de la culture. Ce traitement de l'herbicide Treflan E.C. pourrait se révéler inefficace pour supprimer les mauvaises herbes autres que la sétaire (verte et glauque).

HERBICIDE TREFLAN E.C. ADDITIONNÉ DE L'HERBICIDE AVADEx BW (MÉLANGE EN RÉSERVOIR) : POSTSEMI INCORPORÉ (AU MOYEN D'UNE HERSE)

Cultures homologuées

blé
orge

Mauvaises herbes supprimées

sétaire (verte et glauque)

Mauvaises herbes réprimées

folle-avoine

*L'herbicide Treflan E.C. ne permet pas la suppression de la sétaire verte résistant à la trifluraline. Se référer aux recommandations spécifiques dans le chapitre **MISES EN GARDE** et la section **Résistance des mauvaises herbes** de cette étiquette.

Préparation du sol

Avant l'application, ensemencer le blé ou l'orge à une profondeur de 5 à 8 cm à l'aide d'un semoir ordinaire.

Application et incorporation

Herbicide Treflan E.C. additionné de l'herbicide Avadex BW (mélange en réservoir)

Dose par hectare

Culture	Produit	Texture du sol	
		Légère à moyenne	Lourde
Orge	Herbicide Treflan E.C.	1,2 L/ha	1,7 L/ha
	Herbicide Avadex BW	4,25 L/ha	
Blé	Herbicide Treflan E.C.	1,2 L/ha	1,7 L/ha
	Herbicide Avadex BW	3,5 L/ha	

1. Appliquer et incorporer au sol l'herbicide Treflan E.C. additionné de l'herbicide Avadex mélangé en réservoir au printemps après le semis et avant la levée du blé ou de l'orge.
2. Incorporer le mélange au sol à une faible profondeur (au-dessus de la semence). Pour ce faire, on peut passer à deux reprises une herse à griffes pointues ou en forme de losange ou tout autre instrument similaire sur la surface traitée.
3. Ce mélange ne doit être appliqué qu'aux champs exempts de débris ou en jachère au cours de l'année précédente.

UTILISATION DE L'HERBICIDE TREFLAN E.C. POUR LES FRAISIERS, LES AMÉLANCHIERS ALNIFOLIÉS ET LES ASPERGES ÉTABLIES

Fraisiers

Appliquer l'herbicide Treflan E.C. avant de planter les plants repiqués de fraisiers. Suivre les procédures relatives à la préparation du sol, à l'application et à l'incorporation pour l'herbicide Treflan E.C. N'appliquer le produit qu'au printemps. Ne pas excéder la dose maximale de 2,3 L/ha. Une application excessive peut retarder l'établissement des stolons.

Amélanchiers alnifoliés

Appliquer l'herbicide Treflan E.C. avant de planter les plants repiqués d'amélanchiers alnifoliés. Suivre les procédures relatives à la préparation du sol, à l'application et à l'incorporation pour l'herbicide Treflan E.C. Appliquer le produit au printemps seulement. Ne pas excéder la dose maximale de 2,3 L/ha.

Asperges (établies depuis trois ans)

Suivre les procédures relatives à la préparation du sol, à l'application et à l'incorporation pour l'herbicide Treflan E.C. Appliquer sur des asperges au début du printemps, après avoir enlevé les fougères mais avant la formation des turions; on peut également appliquer l'herbicide Treflan E.C. après la récolte, à la fin du printemps ou au début de l'été avant la formation de fougères.

ATTENTION : Régler les instruments de manière à ne pas endommager les griffes pendant la préparation du sol et l'incorporation.

UTILISATION DE L'HERBICIDE TREFLAN E.C. POUR LES BRISE-VENT

Appliquer l'herbicide Treflan E.C. avant la transplantation des jeunes plants. La dose d'application la plus élevée entraînera une meilleure suppression des mauvaises herbes et une plus grande rémanence dans le sol.

Se référer à la section «Information générale» pour les oléagineux et les cultures spéciales pour plus de détails sur l'application et l'incorporation.

Doses recommandées par hectare pour l'herbicide Treflan E.C. (Litres par hectare)

Culture	Zones de sol et matière organique	Texture du sol	
		Légère	Moyenne à lourde
		Sable loam sableux	loam, loam limono-argileux loam limoneux, loam argileux, limon, argile limoneuse, loam sablo-argileux, argile
fraisiers* amélanchiers alnifoliés*	brun brun foncé ou noir de 2 à 6 % de matière organique	1,7 L/ha	2,3 L/ha
	*Application au printemps seulement noir ou noir foncé de 6 à 15 % de matière organique	2,3 L/ha	2,3 L/ha
asperges établies depuis trois ans		2,0 L/ha	3,1 à 4,2 L/ha*
orme d'Amérique caragan frêne vert pin sylvestre orme de Sibérie		4,7 L/ha (de 2 à 6 % de matière organique)	9,3 L/ha (de 6 à 15 % de matière organique)

*Utiliser la dose la plus forte pour une suppression des mauvaises herbes tout au long de la saison.

NOTE : La dose de 2,3 L/ha de l'herbicide Treflan E.C. peut être appliquée en présemis incorporé une semaine avant d'ensemencer l'orme de Sibérie, pour la suppression des mauvaises herbes annuelles et à feuilles larges.

AVIS À L'UTILISATEUR : LIRE CE QUI SUIT AVANT D'APPLIQUER CE PRODUIT POUR L'USAGE SPÉCIAL INDICÉ : Le MODE D'EMPLOI de ce produit pour le ou les usages spéciaux décrits ci-dessous a été rédigé par des personnes autres que Dow AgroSciences Canada Inc. et est homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Dow AgroSciences Canada Inc. ne formule aucune allégation ni n'offre aucune garantie concernant l'efficacité du produit ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) lorsque ce produit est employé sur les cultures figurant ci-dessous.

En foi de quoi l'utilisateur assume tous les risques relatifs à l'efficacité du produit et à la tolérance des cultures, et il accepte de dégager Dow AgroSciences Canada Inc. de toute responsabilité liée à des réclamations relatives à l'efficacité ou à la phytotoxicité du produit lorsque celui-ci est appliqué aux fins des usages décrits sur la présente étiquette.

HERBICIDE TREFLAN E.C. ADDITIONNE DE L'HERBICIDE SENCOR 75 DF (MELANGE EN RESERVOIR) POUR LES BRISE-VENT

Cultures homologuées

caragan
lilas duveteux
amélanchier alnifolié
frêne vert
cerisier de Virginie
peuplier
argousier

Mauvaises herbes supprimées

sétaire verte
panic capillaire
chénopode blanc
pourpier potager
bourse à pasteur
soude roulante
renouée liseron
tabouret des champs
amarante fausse-blite

Mauvaises herbes réprimées

Folle avoine

MODE D'EMPLOI

Appliquer au sol une seule fois en présems incorporé, à raison de 5,2 L/ha de l'herbicide Treflan E.C. additionné de 400 g/ha de l'herbicide Sencor 75 DF dans 100-225 L d'eau/ha.

IMPORTANT : Se référer à l'étiquette de l'herbicide Treflan C.E pour connaître la séquence de mélange appropriée lorsqu'on mélange l'herbicide Treflan E.C. et l'herbicide Sencor en réservoir.

Se référer à l'étiquette de l'herbicide Sencor pour les modes d'emploi et les précautions particulières.

UTILISATION DE L'HERBICIDE TREFLAN E.C. POUR LES LÉGUMES

Appliquer l'herbicide Treflan E.C. avant la plantation. Suivre les procédures relatives à la préparation du sol, à l'application et à l'incorporation pour l'herbicide Treflan E.C. N'appliquer le produit qu'au printemps.

**UTILISATION DE L'HERBICIDE TREFLAN E.C. POUR LES CULTURES DE LÉGUMES
(APPLICATION AU PRINTEMPS SEULEMENT)**

Doses recommandées de l'herbicide Treflan E.C. par hectare

Culture	Zones de sol et matière organique	Texture du sol	
		Légère	Moyenne ou lourde
		Sable loam sableux	loam, loam limono-argileux loam limoneux, loam argileux, limon, argile limoneuse, loam sablo-argileux, argile
carottes haricots mange-tout, rutabaga tomates brocoli ▼	brun brun foncé ou noir de 2 à 6 % de matière organique	1,7 L/ha	2,3 L/ha
chou de Bruxelles ▼ chou-fleur♦ chou♦	noir ou noir foncé de 6 à 15 % de matière organique	2,3 L/ha	2,3 à 3,0 L/ha†

♦ En semis direct ou repiquage.

▼ Repiquage seulement.

† Utiliser la dose de 3,0 L/ha pour une infestation importante de folle avoine (choux seulement).

**UTILISATION DE L'HERBICIDE TREFLAN E.C. POUR LES LÉGUMINEUSES EN CULTURE
FOURRAGÈRE (PRODUCTION DE SEMENCES/FOURRAGE)**

Appliquer l'herbicide Treflan E.C. avant de semer. Suivre les procédures relatives à la préparation du sol, à l'application et à l'incorporation pour l'herbicide Treflan E.C. N'appliquer le produit qu'au printemps. Ne pas dépasser la dose maximale de 2,3 L/ha.

Doses recommandées de l'herbicide Treflan E.C. par hectare (Litres par hectare)

Culture	Zones de sol et matière organique	Texture du sol	
		Légère	Moyenne ou lourde
		Sable loam sableux	loam, loam limono-argileux loam limoneux, loam argileux, limon, argile limoneuse, loam sablo-argileux, argile
plants de trèfle hybride trèfle rouge astragale pois chiche lotier corniculé	brun brun foncé ou noir de 2 à 6 % de matière organique	1,7 L/ha	2,3 L/ha
	noir ou noir foncé de 6 à 15 % de matière organique	2,3 L/ha	2,3 L/ha

HERBICIDE TREFLAN E.C. UTILISÉ L'EST DU CANADA ET LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Cultures homologuées

soya	plantes ornementales (ligneuses de pépinière),
haricots communs secs (blanc ou rouge)	vivaces
féverole (faba)	tournesol
haricot mange-tout,	navet à chaume (blanc) pour animaux
haricot de Lima	seulement
fève noire	pois (de grande culture ou de transformation)
colza canola	moutarde
colza canola résistant aux triazines (semence	luzerne (à semis direct)
sélectionnée seulement)	blé d'hiver, seigle d'automne et triticales
colza fourrager	d'automne (suppression de l'argrostide jouet-
chou frisé fourrager	du-vent seulement)
plants repiqués : tomates, poivrons, choux de	brise-vent transplantés
Bruxelles, brocolis, choux, choux-fleurs et	rutabaga
fraisiers (application au printemps seulement)	asperge établie depuis trois ans
crambe	pommier, abricotier, cerisier, pêcher, prunier et
carotte	poirier de première année
chou et chou-fleur à semis direct	

Mauvaises herbes supprimées

Graminées annuelles

pied-de-coq
digitaire pourpre
brome des toits
brome des seigles
éragrostide fétide
éleusine de l'Inde
pâturin annuel
sétaire (verte et glauque)
panic d'automne
agrostide jouet-du-vent

Espèces annuelles à feuilles larges

amarante*
chénopode blanc*
stellaire
pourpier potager
renouée des oiseaux
mollugine verticillée

* y compris les variétés résistant aux triazines

Mauvaises herbes réprimées

folle avoine

NOTE : Employé selon les directives, l'herbicide Treflan E.C. permet, sur le plan commercial, une suppression acceptable des mauvaises herbes susmentionnées.

Doses recommandées de l'herbicide Treflan E.C. par hectare - L'Est du Canada et la Colombie-Britannique

Culture	Texture du sol		
	Légère	Moyenne	Lourde
	Sable loam sableux	loam, loam limoneux, limon, loam sablo-argileux	loam limono-argileux, argile limoneuse, loam argileux argile
Toutes les cultures homologuées (sauf l'asperge, les céréales d'hiver, le pois et le haricot de Lima)	1,2 L	1,7 L	2,4 L

Les quantités susmentionnées sont les doses généralement recommandées pour l'herbicide Treflan E.C. Les remarques ci-après s'appliquent à des cultures particulières.

- Pour le haricot de Lima et le pois, ne pas dépasser 1,2 L/ha dans les sols à texture moyenne et 1,7 L/ha dans les sols à texture lourde.
- Dans les sols sableux ou les loams sableux, on ne devrait pas utiliser l'herbicide Treflan E.C. sur le navet ou la moutarde.
- Les cultures de chou à semis direct ont fait preuve d'une très faible tolérance aux doses recommandées de l'herbicide Treflan E.C. L'application de ce produit peut entraîner un certain rabougrissement ou une diminution du rendement.
- Pour les fraisiers, l'herbicide Treflan E.C. devrait être appliqué avant le repiquage des plants.
- Pour les plantes ornementales et les espèces ligneuses établies provenant de pépinières, pulvériser l'herbicide sur le sol et l'incorporer aussi près que possible des plantes, sans endommager leurs racines.
- On ne devrait pas appliquer l'herbicide Treflan E.C. sur des couvre-sol ornementaux comme la bugle rampante, le myrte et la pachysandra, car il pourrait les endommager.
- À moins d'avis contraire, utiliser les doses générales de l'herbicide Treflan E.C.; appliquer et incorporer immédiatement avant de planter ou jusqu'à trois semaines avant le semis.

APPLICATION DE L'HERBICIDE TREFLAN E.C. AVEC DES ENGRAIS LIQUIDES

On peut mélanger l'herbicide Treflan E.C. à un engrais azoté liquide (comme le 28-0-0) pour une application en présemis. On doit cependant se conformer à toutes les indications données sur l'étiquette de l'herbicide Treflan E.C.: doses par hectare, cultures homologuées, incorporation, instructions spéciales, mises en garde et précautions particulières.

Verser l'herbicide Treflan E.C. directement dans l'engrais liquide, mélanger à fond et appliquer aussitôt que possible. Agiter sans arrêt jusqu'à la fin de l'application. Pulvériser la bouillie ainsi obtenue à l'aide d'un pulvérisateur bien calibré. S'assurer que le produit est appliqué uniformément à la surface du sol. Pour l'incorporation, procéder de la façon normale.

Essai de compatibilité

Avant de mélanger l'engrais liquide et l'herbicide dans le réservoir, mélanger de petites quantités des deux pour voir s'ils sont compatibles.

1. Verser 500 mL d'engrais liquide dans un récipient de 1 litre.
2. Ajouter 10 mL de l'herbicide Treflan E.C.

3. Fermer le récipient et bien agiter.
4. L'herbicide et l'engrais sont compatibles si le premier reste en suspension après cinq minutes. Si l'herbicide se dépose rapidement, mais se remet en suspension facilement après agitation, on peut utiliser le mélange à condition de l'agiter constamment.
5. Un essai de compatibilité devrait être effectué aussi chaque fois que l'on change d'engrais ou de composition d'engrais, ou que les températures varient.

HERBICIDE TREFLAN E.C. MÉLANGÉ PAR IMPRÉGNATION OU ENROBAGE À UN ENGRAIS GRANULAIRE

Un engrais granulaire en vrac peut être imprégné ou enrobé de l'herbicide Treflan E.C. L'application devrait être effectuée le plus tôt possible après le mélange. Il faut se conformer à toutes les recommandations, précautions, mises en garde et directives spéciales qui apparaissent sur l'étiquette Herbicide Treflan E.C. concernant entre autres les doses par hectare, les cultures homologuées et l'incorporation.

Il faut appliquer, à la dose recommandée, au moins 300 kg/ha d'engrais granulaire en vrac imprégné ou enrobé de l'herbicide Treflan E.C. Mélanger l'engrais granulaire et l'herbicide Treflan E.C. dans un mélangeur d'engrais ordinaire, de façon à obtenir une couverture uniforme. Mélanger suffisamment longtemps pour obtenir un bon enrobage ou une bonne imprégnation.

Épandre le mélange d'engrais et d'herbicide Treflan E.C. uniformément sur la surface du sol, avec un applicateur d'engrais granulaire correctement calibré. La première incorporation doit se faire le plus tôt possible (dans les 24 heures) après l'application. Pour une dispersion maximale de l'herbicide Treflan dans le sol, on recommande **d'attendre au moins trois jours avant de procéder à la seconde incorporation.**

ATTENTION : On peut utiliser n'importe quel engrais granulaire pour l'imprégnation de l'herbicide Treflan E.C., à l'exception du nitrate d'ammonium.

NOTE : Il incombe à la personne ou à la compagnie qui vend le mélange d'engrais et d'herbicide Treflan E.C. de se conformer à la Loi sur les engrais (Agriculture et Agroalimentaire Canada) et aux règlements s'y rapportant.

HERBICIDE TREFLAN E.C. POUR LE SOYA

L'herbicide Treflan E.C., incorporé avant le semis du soya, supprimera la plupart des graminées annuelles et un grand nombre de mauvaises herbes à feuilles larges. Pour supprimer un plus grand nombre de mauvaises herbes, combiner l'herbicide Treflan E.C. aux produits suivants :

HERBICIDE TREFLAN E.C. ADDITIONNÉ DE L'HERBICIDE SENCOR OU L'HERBICIDE LEXONE⁷ (MÉLANGE EN RÉSERVOIR)

Dose par hectare

Produit	Texture du sol		
	Légère	Moyenne	Lourde
Herbicide Treflan E.C.	1,2 L	1,7 L	2,4 L
Herbicide Sencor 500 F	850 mL	1,1 L	1,1 L
Herbicide Sencor 75 DF	550 g	750 g	750 g
Herbicide Lexone DF	-	550 g	700 g

- Les mélanges en réservoir suppriment toutes les mauvaises herbes énumérées sur l'étiquette de l'herbicide Treflan E.C., ainsi que beaucoup d'autres mauvaises herbes à feuilles larges, y compris la renouée persicaire, l'abutilon, la moutarde des champs et la petite herbe à poux.

- La suppression de la lampourde glouteron varie de bon à excellent selon la température du sol, le moment de la germination et la profondeur d'enfouissement des graines de mauvaises herbes, ainsi que le degré et la période d'humidité dans le sol. On peut améliorer la suppression des mauvaises herbes en travaillant le sol.
- Les mélanges en réservoir de l'herbicide Treflan E.C. et de l'herbicide Sencor ou l'herbicide Lexone peuvent être appliqués jusqu'à 10 jours avant les semis.
- Ne pas utiliser sur des sols légers contenant moins de 2 % de matière organique.
- Appliqué selon le mode d'emploi et dans des conditions normales de croissance, le mélange en réservoir de l'herbicide Treflan E.C. et de l'herbicide Sencor ou l'herbicide Lexone ne réduira pas le rendement du soya.
- Par contre, cette culture tolère moins bien l'herbicide Sencor ou l'herbicide Lexone employé seul dont l'application pourrait causer des dommages dans certaines conditions.
- Une application excessive peut rabougir les plantes, endommager les cultures ou laisser des résidus dans le sol.
- Ces mélanges en réservoir, appliqués de façon inégale ou mal incorporés, risquent d'entraîner une suppression irrégulière des mauvaises herbes ou de causer des dommages aux cultures selon les doses utilisées.
- Les maladies des semis, le temps froid, un semis trop profond, une humidité excessive, un pH élevé du sol (plus de 7,5), une forte concentration de sel ou la sécheresse peuvent affaiblir les plants de soya et augmenter les risques de dommages consécutifs à l'application du mélange de l'herbicide Treflan E.C. et de l'herbicide Sencor ou l'herbicide Lexone. De telles conditions pourraient retarder le développement de la culture ou en réduire le rendement.
- Dans les sols variables comportant des zones sableuses légères, la culture pourrait être endommagée dans ces zones si les doses sont recommandées pour un sol lourd. Les loams sableux ou limono-argileux sont des sols transitionnels et, dans certaines régions, peuvent être classés parmi les sols de texture moyenne.
- Dans les champs traités à l'herbicide Sencor ou l'herbicide Lexone, ne pas semer les variétés de soya sensibles à la métribuzine : Ace, Apache, Baron, Maple Amber, Maple Ridge, OAC Eramosa, IA 1003, S-240 ou Nottawa. Autrement, la culture pourrait subir des dommages inacceptables.
- Consulter l'étiquette de l'herbicide Sencor ou de l'herbicide Lexone pour connaître les recommandations particulières. Ne pas utiliser comme fourrage le feuillage du soya traité avec ce mélange.

IL EST IMPORTANT DE SUIVRE LES ÉTAPES CI-DESSOUS POUR MÉLANGER DANS LE RÉSERVOIR DU PULVÉRISATEUR L'HERBICIDE TREFLAN E.C. ET L'HERBICIDE SENCOR OU L'HERBICIDE LEXONE.

1. Remplir le réservoir avec de l'eau propre, au quart ou au tiers de sa capacité.
2. Durant le remplissage, et après avoir mis en marche le système d'agitation et de recirculation, verser lentement dans le réservoir toute la dose nécessaire de l'herbicide Sencor ou l'herbicide Lexone.
3. Remplir le réservoir d'eau propre jusqu'au niveau désiré, tout en continuant d'agiter le mélange.
4. Après avoir bien mélangé, ajouter la quantité mesurée de l'herbicide Treflan E.C. et agiter à fond.
5. Il faut agiter sans arrêt jusqu'à ce que le mélange soit pulvérisé; sinon, l'agent chimique se déposera au fond et il faudra le mélanger vigoureusement à l'aide d'une palette pour le redisperser dans le réservoir.

Toute dérogation à ce mode de mélange pourrait provoquer une incompatibilité.

HERBICIDE TREFLAN E.C., SUIVI DE L'HERBICIDE LOROX L⁸ OU L'HERBICIDE AFOLAN F⁹ (APPLICATION ALTERNÉE)

Dose par hectare

Application/produit	Texture du sol		
	Légère	Moyenne	Lourde
Herbicide Treflan E.C. incorporé en présemis	1,2 L	1,7 L	2,4 L
Herbicide Afolan F en prélevée	--	2,0 L	2,7 L
Herbicide Lorox L en prélevée	--	1,75 L	2,25 L

- Ne pas employer l'herbicide Afolan F sur un sol sableux à faible teneur en matière organique (moins de 3 %). Faire une seule application de l'herbicide Afolan F.
- Appliquer l'herbicide Afolan F par pulvérisation en bande ou sur toute la surface après le semis du soya (à 5 cm au moins de profondeur), mais avant sa levée. Consulter l'étiquette de l'herbicide Afolan F pour connaître les recommandations et précautions particulières.
- En ce qui concerne l'herbicide Lorox L, utiliser la dose de 1,75 L sur les sols de couleur pâle à teneur moyenne en matière organique (de 2 à 5 %). Ne pas l'employer sur des sols à texture grossière à faible teneur en matière organique, ce qui risquerait d'endommager la culture. Consulter l'étiquette de l'herbicide Lorox L pour connaître les recommandations particulières.

HERBICIDE TREFLAN E.C., SUIVI DE L'HERBICIDE BASAGRAN¹⁰ AVEC L'HERBICIDE ASSIST¹¹ (APPLICATION ALTERNÉE)

Dose par hectare

Application/produit	Texture du sol		
	Légère	Moyenne	Lourde
Herbicide Treflan E.C. incorporé en présemis	1,2 L	1,7 L	2,4 L
Postlevée – Herbicide Basagran avec Herbicide Assist (0,5 à 1 % du volume de la bouillie de pulvérisation)	1,75 L à 2,25 L		

- Utiliser l'herbicide Basagran comme traitement en postlevée à raison de 1,75 à 2,25 L/ha (selon les mauvaises herbes présentes), plus l'herbicide Assist à raison de 0,5 à 1 % du volume de la bouillie à pulvériser. L'étiquette de l'herbicide Basagran indique le stade de la culture où ce produit permet d'obtenir une suppression optimale des mauvaises herbes; on y trouve aussi des recommandations particulières.

HERBICIDE TREFLAN E.C. POUR LES HARICOTS COMMUNS SECS (BLANCS OU ROUGES)

L'herbicide Treflan E.C., incorporé avant le semis des haricots communs secs (blancs et rouges), supprimera la plupart des graminées annuelles et un grand nombre de mauvaises herbes à feuilles larges. Pour supprimer un plus grand nombre de mauvaises herbes, combiner l'herbicide Treflan E.C. à l'un des produits suivants :

HERBICIDE TREFLAN E.C. ADDITIONNÉ DE L'HERBICIDE EPTAM¹² (MÉLANGE EN RÉSERVOIR)**Dose par hectare**

Application/produit	Texture du sol		
	Légère	Moyenne	Lourde
Herbicide Treflan E.C. incorporé en présemis	1,2 L	1,2 L	2,0 L
Herbicide Eptam	2,5 - 3,75 L		

- Ne pas employer un mélange de l'herbicide Eptam et de l'herbicide Treflan E.C. sur le haricot Adzuki, le dolique à oeil noir, le soya, le haricot de Lima ou toute autre variété de haricot à gousse plate, sauf le haricot romain (Romano). Lorsque les conditions atmosphériques sont défavorables, la croissance peut être retardée chez les variétés Gratiot, Michilite, Sanilac, Seafarer et Seaway. Ne pas utiliser dans les terres noires ni les sols organiques. Lire et observer le mode d'emploi et les mises en garde figurant sur l'étiquette de l'herbicide Eptam.

HERBICIDE TREFLAN E.C. ADDITIONNÉ DE L'HERBICIDE PATORAN FL¹³ (APPLICATION ALTERNÉE)**Dose par hectare**

Application/produit	Texture du sol		
	Légère	Moyenne	Lourde
Herbicide Treflan E.C. incorporé en présemis	1,2L	1,7L	2,4L
Herbicide Patoran FL, en prélevée (400g/L)	2,9 à 3,4L		
Herbicide Patoran FL, en prélevée (670g/L)	1,75 à 2,0L		

Utiliser ces doses de l'herbicide Patoran FL (400g/L et 670g/L) seulement après une application et incorporation d'herbicide en présemis. Pour les haricots communs secs (blancs ou rouges), il faut augmenter la dose lorsque le produit est employé seul. Consulter les étiquettes de chacun d'eux pour connaître les recommandations particulières.

HERBICIDE TREFLAN E.C., SUIVI DE L'HERBICIDE BASAGRAN AVEC L'HERBICIDE ASSIST

Consulter la section consacrée au soya; l'application de l'herbicide Treflan E.C. doit être suivie d'un traitement en postlevée avec de l'herbicide Basagran additionné de l'herbicide Assist.

AVIS À L'UTILISATEUR : LIRE CE QUI SUIV AVANT D'APPLIQUER CE PRODUIT POUR L'USAGE SPÉCIAL INDIQUÉ : Le MODE D'EMPLOI de ce produit pour le ou les usages spéciaux décrits ci-dessous a été rédigé par des personnes autres que Dow AgroSciences Canada Inc. et est homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Dow AgroSciences Canada Inc. ne formule aucune allégation ni n'offre aucune garantie concernant l'efficacité du produit ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) lorsque ce produit est employé sur les cultures figurant ci-dessous.

En foi de quoi l'utilisateur assume tous les risques relatifs à l'efficacité du produit et à la tolérance des cultures, et il accepte de dégager Dow AgroSciences Canada Inc. de toute responsabilité liée à des réclamations relatives à l'efficacité ou à la phytotoxicité du produit lorsque celui-ci est appliqué aux fins des usages décrits sur la présente étiquette.

MODE D'EMPLOI

HERBICIDE TREFLAN E.C. ADDITIONNÉ DE L'HERBICIDE PURSUIT¹⁵ (MÉLANGE EN RÉSERVOIR) : PRÉSEMIS INCORPORÉ POUR LES HARICOTS BLANCS

Le mélange en réservoir de l'herbicide Treflan E.C. et de l'herbicide Pursuit assure la suppression des mauvaises herbes à feuilles larges et des graminées dans les cultures de haricots blancs. Voir les étiquettes des produits pour une liste complète des mauvaises herbes supprimées. Ne faire qu'une seule application par saison. Application au sol en présemis incorporé.

Doses d'application :

Herbicide Treflan E.C. : 1,25 – 2,4 l/ha

Herbicide Pursuit : 313 ml/ha

Voir les étiquettes principales de l'herbicide Treflan E.C. et de l'herbicide Pursuit pour des instructions, recommandations et précautions particulières.

LIRE LES RESTRICTIONS CONCERNANT LA ROTATION DES CULTURES FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE COMPLÈTE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

HERBICIDE TREFLAN E.C. POUR LE COLZA CANOLA DE PRINTEMPS ORDINAIRE ET LE COLZA CANOLA RÉSISTANT AUX TRIAZINES

Colza canola ordinaire

L'herbicide Treflan E.C., incorporé seul avant le semis du canola, supprimera la plupart des graminées annuelles et un bon nombre de mauvaises à feuilles larges. Consulter les informations générales pour connaître les doses d'application et les recommandations.

Colza canola résistant aux triazines

L'herbicide Treflan E.C., incorporé seul avant le semis du canola, supprimera la plupart des graminées annuelles et un bon nombre de mauvaises à feuilles larges. Pour supprimer un plus grand nombre de mauvaises herbes, combiner l'herbicide Treflan E.C. à l'un des produits suivants :

HERBICIDE TREFLAN E.C. ADDITIONNÉ D'UN HERBICIDE DE POSTLEVÉE DE LA FAMILLE DES TRIAZINES HOMOLOGUÉ POUR LE COLZA CANOLA RÉSISTANT AUX TRIAZINES

NOTE : CE TRAITEMENT NE CONVIENT QU'AU COLZA CANOLA RÉSISTANT AUX TRIAZINES; LE MÉLANGE DÉTRUIRA LE COLZA CANOLA QUI NE RÉSISTE PAS AUX TRIAZINES.

On peut appliquer l'herbicide Treflan E.C. au printemps sur le colza canola résistant aux triazines. Pour supprimer plusieurs autres mauvaises herbes, on peut ensuite appliquer un herbicide de postlevée de la famille des triazines approuvé pour cet usage, après la levée de la culture. Consulter les étiquettes des herbicides de postlevée pour connaître les recommandations particulières relatives à ces produits; respecter les mises en garde et précautions qui y sont énoncées.

HERBICIDE TREFLAN E.C. POUR LES TOMATES

L'herbicide Treflan E.C., incorporé avant le semis des tomates, supprimera la plupart des graminées annuelles et un bon nombre de mauvaises herbes à feuilles larges. Afin de supprimer un plus grand nombre de mauvaises herbes, combiner l'herbicide Treflan E.C. à l'herbicide Sencor pour les cultures suivantes :

HERBICIDE TREFLAN E.C. ADDITIONNÉ DE L'HERBICIDE SENCOR DANS LES TOMATES TRANSPLANTÉES (CULTIVÉES SEULEMENT POUR LA TRANSFORMATION)

Dose par hectare

Application/produit	Texture du sol		
	Légère	Moyenne	Lourde
Herbicide Treflan E.C. incorporé en présemis	1,2 L	1,7 L	2,4 L
Herbicide Sencor 500 F incorporé* en présemis	0,5 à 0,6 L	0,75 à 1,1 L	1,2 à 1,4 L
Suivi de l'herbicide Sencor 500 F en postlevée	0,85 L	1,1 L	1,2 à 1,4 L

* Mélangé en réservoir à l'herbicide Treflan E.C.

- Un traitement dirigé en postlevée au moyen de l'herbicide Sencor 500F permet de supprimer les mauvaises herbes qui ont échappé au traitement avant qu'elles n'atteignent 2,5 cm de hauteur et au moins 3 semaines après la transplantation des tomates. Ce traitement devrait aussi laisser une quantité résiduelle de l'herbicide Sencor 500 F pour agir durant toute la saison.
- Cette application de l'herbicide Sencor après la levée est normalement effectuée au début de juillet, mais doit se faire au moins 21 jours après la transplantation des tomates ou au plus tard 60 jours avant la récolte.
- Consulter l'étiquette de l'herbicide Sencor 500 F pour connaître les autres instructions et précautions.
- L'herbicide Treflan E.C. peut endommager les plantons affaiblis par toute cause et entraîner une réduction du rendement. Pour empêcher les dommages, utiliser seulement des plants en bonne santé; ne pas planter dans des conditions de croissance froides, humides ou défavorables. Se conformer à toutes les directives relatives à l'application et à l'incorporation.

UTILISATION DE L'HERBICIDE TREFLAN E.C. SUR DES ASPERGES ÉTABLIES DEPUIS TROIS ANS

Suivre les méthodes recommandées de l'herbicide Treflan E.C. en matière de préparation du sol, d'application et d'incorporation. Appliquer sur des asperges établies, au début du printemps, après avoir enlevé les fougères mais avant la formation des turions; l'application peut se faire aussi après la récolte, à la fin du printemps ou au début de l'été avant la formation des fougères.

ATTENTION : Régler les instruments de manière à ne pas endommager les griffes pendant la préparation du sol et l'incorporation.

Dose par hectare

	Texture du sol		
	Légère	Moyenne	Lourde
Herbicide Treflan E.C.	2,0 L	3,1 L	4,2 L

HERBICIDE TREFLAN E.C. UTILISÉ SUR LES CÉRÉALES D'AUTOMNE CULTIVÉES EN ROTATION AVANT LE TABAC JAUNE, POUR SUPPRIMER L'AGROSTIDE JOUET-DU-VENT

INCORPORÉ EN POSTSEMIS (au moyen d'une herse)

Cultures homologuées

blé d'hiver
seigle d'automne
triticale d'automne

On doit appliquer et incorporer l'herbicide Treflan E.C. au sol à l'automne, aussitôt que possible **après la plantation** et avant la levée de la céréale d'automne, de façon à supprimer l'agrostide jouet-du-vent. Pour ce faire, on établit une couche peu profonde (2 cm) de l'herbicide Treflan E.C. près de la surface du sol; l'herbicide Treflan E.C. supprime l'agrostide en arrêtant sa croissance à mesure que les semences germent. Ce traitement est sans danger pour la culture, puisque les semences de la céréale d'automne se trouvent dans la partie non traitée du sol, sous la couche de l'herbicide Treflan E.C.

Application et incorporation

Semer les céréales d'automne à une profondeur de 5 à 8 cm dans un lit de semence bien travaillé. Au moyen d'un pulvérisateur d'herbicide bien calibré, appliquer l'herbicide Treflan E.C. à une dose de 0,8 à 1,2 L/ha dans un minimum de 100 L/ha d'eau. Pour les infestations importantes d'agrostide jouet-du-vent, utiliser la dose de 1,2 L/ha. L'application doit se faire sur un sol sans débris, aussitôt que possible après le semis, et avant la levée de la culture. Incorporer à une faible profondeur avec une herse à griffes pointues ou en forme de losange, dans deux directions différentes, à une vitesse d'au moins 8 km/h. Les deux incorporations doivent avoir lieu dans les 24 heures suivant l'application.

HERBICIDE TREFLAN E.C. UTILISÉ SUR DES POMMIERS, ABRICOTIERS, CERISIERS, PÊCHERS, PRUNIER ET POIRIERS DE PREMIÈRE ANNÉE

Appliqué et incorporé avant la transplantation des arbres fruitiers, l'herbicide Treflan E.C. supprimera la plupart des graminées annuelles et bon nombre de mauvaises herbes à feuilles larges. Pour supprimer d'autres mauvaises herbes, on peut mélanger en réservoir l'herbicide Treflan E.C. avec l'herbicide Sencor. Ne pas faire plus d'une application par année.

Doses recommandées par hectare

Produit	Texture du sol		
	Légère	Moyenne	Lourde
	Sable loam sableux	loam, loam limoneux, limon, loam sablo- argileux	loam limono-argileux, argile limoneuse, loam argileux argile
Herbicide Treflan E.C.	1,2 L	1,7 L	2,4 L
Herbicide Sencor 500 F	850 mL	1,1 L	1,1 L
Herbicide Sencor 75 DF	550 g	750 g	750 g

Consulter l'étiquette de l'herbicide Sencor pour connaître le mode d'emploi et les précautions spéciales à observer.

AVIS À L'UTILISATEUR : LIRE CE QUI SUIT AVANT D'APPLIQUER CE PRODUIT POUR L'USAGE SPÉCIAL INDiqué : Le MODE D'EMPLOI de ce produit pour le ou les usages spéciaux décrits ci-dessous a été rédigé par des personnes autres que Dow AgroSciences Canada Inc. et est homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Dow AgroSciences Canada Inc. ne formule aucune allégation ni n'offre aucune garantie concernant l'efficacité du produit ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) lorsque ce produit est employé sur les cultures figurant ci-dessous.

En foi de quoi l'utilisateur assume tous les risques relatifs à l'efficacité du produit et à la tolérance des cultures, et il accepte de dégager Dow AgroSciences Canada Inc. de toute responsabilité liée à des réclamations relatives à l'efficacité ou à la phytotoxicité du produit lorsque celui-ci est appliqué aux fins des usages décrits sur la présente étiquette.

HERBICIDE TREFLAN E.C. ADDITIONNE DE L'HERBICIDE DUAL MAGNUM OU DE L'HERBICIDE DUAL II MAGNUM ET L'HERBICIDE SENCOR (MÉLANGE EN RÉSERVOIR) PRÉSEMI INCORPORÉ POUR LES TOMATES TRANSPLANTÉES

MODE D'EMPLOI

Un mélange en réservoir de l'herbicide Treflan E.C., de l'herbicide Dual Magnum ou l'herbicide Dual II Magnum et de l'herbicide Sencor permet la suppression des mauvaises herbes à feuilles larges (y compris les biotypes résistant aux triazines), les graminées annuelles ainsi que la morelle noire de l'est. N'effectuer qu'une seule pulvérisation par année. **NE PAS PULVÉRISER DIRECTEMENT SUR LES TOMATES SEMÉES EN DIRECT.** Dans des conditions froides et humides ou susceptibles d'affecter l'établissement des plantules : appliquer la bouillie à pulvériser et l'incorporer à faible profondeur (5-7,5 cm), puis semer les plantules à une profondeur de 5-10 cm. Ne pas récolter la culture dans les 60 jours suivant l'application. Employer les doses inscrites au tableau 1.

Tableau 1 : Doses recommandées de l'herbicide Treflan E.C., l'herbicide Dual Magnum ou l'herbicide Dual II Magnum et l'herbicide Sencor (Mélange en réservoir) pour les tomates transplantées

Composant du mélange en réservoir	Doses par hectare pour textures spécifiques du sol	
	Légère	Moyenne à lourde
Herbicide Treflan E.C.	1,1 L	2,1 L
Herbicide Dual Magnum ou		
Herbicide Dual II Magnum	1,0 L	1,25 L *
Herbicide Sencor 500 F	0,5 L	1,0 L
OU		
Herbicide Sencor 75 DF	330 g	670 g

* Pour supprimer la morelle noire de l'est, utiliser la dose la plus élevée de l'herbicide Dual Magnum ou l'herbicide Dual II Magnum.

•Se référer aux étiquettes de l'herbicide Dual Magnum ou l'herbicide Dual II Magnum et l'herbicide Sencor pour des recommandations et des précautions spécifiques.

Séquence de mélange

Il est important de suivre les étapes ci-dessous pour mélanger dans le réservoir du pulvérisateur l'herbicide Treflan E.C., l'herbicide Sencor et l'herbicide Dual.

Les étapes suivantes sont essentielles lorsqu'on combine l'herbicide Treflan E.C., l'herbicide Sencor et l'herbicide Dual dans le réservoir du pulvérisateur.

1. Remplir le réservoir avec de l'eau propre, au quart ou au tiers de sa capacité.
2. Durant le remplissage, et après avoir mis en marche le système d'agitation et de recirculation, verser lentement dans le réservoir toute la dose nécessaire de l'herbicide Sencor.
3. Remplir le réservoir d'eau propre jusqu'au niveau désiré, tout en continuant d'agiter le mélange.
4. Après avoir bien mélangé, ajouter la quantité mesurée de l'herbicide Treflan E.C. et agiter à fond.
5. Ajouter la quantité mesurée de l'herbicide Dual Magnum ou l'herbicide Dual II Magnum et agiter à fond.
6. Pour éviter des problèmes de compatibilité, appliquer immédiatement. Il faut agiter sans arrêt jusqu'à ce que le mélange soit pulvérisé; sinon, l'agent chimique se déposera au fond et il faudra le mélanger vigoureusement à l'aide d'une palette pour le redisperser dans le réservoir.

ZONES TAMPONS SERVANT À PROTÉGER LES HABITATS SENSIBLES

Il est nécessaire que les zones tampons précisées dans le tableau ci-dessous séparent le point d'application directe du produit et la lisière la plus proche, dans la direction du vent, des habitats terrestres vulnérables (tels que prairies, forêts, brise-vent, terres à bois, haies, zones riveraines et zones arbustives), des habitats d'eau douce vulnérables (tels que lacs, rivières, brouillards, étangs, fondrières des Prairies, ruisseaux, marais, réservoirs et milieux humides) et des habitats estuariens et marins vulnérables.

Tableau des zones tampons

Méthode d'application	Culture	Zones tampons (en mètres) nécessaires à la protection des :				
		Habitats d'eau douce d'une profondeur de :		Habitats estuariens ou marins d'une profondeur de :		Habitats terrestres
		moins de 1 m	plus de 1 m	moins de 1 m	plus de 1 m	
Pulvérisateur agricole*	Blé, seigle et triticales semés à l'automne comme cultures de rotation avec le tabac	35	4	3	1	0
	Rutabagas, légumineuses fourragères, amélanchiers à feuilles d'aulne, carottes, piments, fraises, tomates, jachères d'été suivies de la culture de blé de printemps ou de blé dur, navets blancs, choux frisés fourragers, colza fourrager, ainsi que pommiers, abricotiers, cerisiers, pêchers, pruniers et poiriers plantés au cours de l'année	55	5	4	2	1
	Choux de Bruxelles, choux-fleurs et choux marins, sainfoin et mélilot	70	10	5	2	1
	Luzerne, haricots (haricots communs, haricots secs, haricots noirs, haricots de Lima), féveroles, haricots à gousse comestible, pois, soja, tournesol, lentilles, orge et blé, canola/colza, canola/colza tolérant à la triazine, lin, moutarde et carthame	80	10	5	3	1
	Asperges, broccoli et choux	90	10	5	3	1
	Plantes ornementales ligneuses ou vivaces cultivées en pépinière (au champ ou en contenants), brise-vent (orme d'Amérique, caraganas, frêne vert, pin d'Écosse et orme de Sibérie)	120	20	15	5	1

*Dans le cas de la pulvérisation agricole, il est possible de réduire les zones tampons au moyen d'écrans et de cônes de réduction de la dérive. Les pulvérisateurs dont la rampe de pulvérisation est équipée d'un écran sur toute sa longueur et qui s'étend jusqu'au couvert végétal permettent de réduire la zone tampon figurant sur l'étiquette de 70 %. L'utilisation d'une rampe de pulvérisation dont chaque buse est munie d'un écran conique fixé à une hauteur inférieure à 30 cm du couvert végétal permet de réduire la zone tampon mentionnée sur l'étiquette de 30%.

Lorsqu'on emploie un mélange en cuve, il faut prendre connaissance de l'étiquette des autres produits entrant dans le mélange, et respecter la zone tampon la plus vaste parmi celles exigées pour ces produits (restriction la plus sévère).

RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE

Gestion de la résistance à l'herbicide Treflan E.C., herbicide du groupe 3. Toute population de mauvaises herbes peut renfermer ou former des plantes naturellement résistantes à l'herbicide Treflan E.C. et à d'autres herbicides du groupe 3. Les biotypes résistants peuvent finir par prédominer au sein de la population si ces herbicides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux herbicides:

- Dans la mesure du possible, alterner l'herbicide Treflan E.C. ou les herbicides du même groupe 3 avec des herbicides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes mauvaises herbes au champ.
- Utiliser des mélanges en cuve contenant des herbicides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.
- Utiliser les herbicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des inspections sur le terrain, des relevés d'utilisations antérieures de pesticides et de la rotation des cultures et faisant place à la possibilité d'intégrer des pratiques de labour (ou d'autres méthodes mécaniques) ou des pratiques de lutte culturale, biologique et d'autres formes de lutte chimique.
- Inspecter les populations de mauvaises herbes traitées pour y découvrir les signes de l'acquisition d'une résistance.
- Empêcher la propagation à d'autres champs des mauvaises herbes résistantes en nettoyant le matériel de labour et de récolte et en utilisant des semences non contaminées.
- Pour des cultures précises ou des biotypes de mauvaises herbes précis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée contre les mauvaises herbes.
- Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser à Dow AgroSciences Canada Inc. au 1-800-667-3852 ou à www.dowagro.ca.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

¹ Triflurex est une marque de commerce de Makhteshim - Agan of North America Inc.

² Rival est une marque de commerce de Nufarm Agriculture Inc.

³ Fortress est une marque de commerce de Gowan Company LLC

⁴ Avadex BW est une marque de commerce de Gowan Company LLC

⁶ Sencor est une marque de commerce de Bayer CropScience Inc.

⁷ Lexone est une marque de commerce de E.I. Dupont Canada Company

⁸ Lorox L est une marque de commerce de E.I. Dupont Canada Company

⁹ Afolan F est une marque de commerce de Makhteshim - Agan of North America Inc.

¹⁰ Basagran est une marque de commerce de BASF Canada Inc.

¹¹ Assist est une marque de commerce de BASF Canada Inc.

¹² Eptam est une marque de commerce de d'une Gowan Company LLC

¹³ Patoran FL est une marque de commerce de d'une compagnie du groupe Syngenta

¹⁵ Pursuit est une marque de commerce de BASF Canada Inc.

TMHeritage, TMAdvance, Treflan est une marque déposée de The Dow Chemical Company ("Dow") ou d'une société affiliée